

# Informacja dotycząca grypy ptaków

## **Wysoce zjadliwa grypa ptaków podtypu H5N8**

Informujemy, że na terenie Europy w ostatnim czasie stwierdzane są przypadki wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8. Do chwili obecnej (05.02.2015 r.) odnotowano trzynaście ognisk:

- **Holandia (5 ognisk)**

w prowincjach: Utrecht, Zuid-Holland (2 ogniska), Overijssel (2 ogniska)

- **Niemcy (6 ognisk)**

w powiatach: Vorpommern-Greifswald, Cloppenburg, Emsland, Greifswald (2 ogniska), Rostock (w ZOO)

- **Wielka Brytania (1 ognisko)**

w hrabstwie North Yorkshire

- **Włochy (1 ognisko)**

w prowincji: Rovigo

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 również został stwierdzony u dzikich kaczek w Niemczech i Holandii.

## **Wysoce zjadliwa grypa ptaków podtypu H5N1**

W 2015 roku w **Bułgarii** w obwodzie Burgas wykryto wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N1 u pelikana dalmatyńskiego, znalezionej nad brzegiem Morza Czarnego oraz w gospodarstwie utrzymującym nioski gatunku kura w miejscowości Konstantinovo.

- **Wariant wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (H5N8), o którym mowa powyżej charakteryzuje się wysokim stopniem zaraźliwości.**
- **Choroba rozwija się wśród niespecyficznych objawów takich jak np. apatia, zmniejszenie pobierania paszy i wody, spadek produkcji, umiarkowana śmiertelność w stadzie.**
- **W przypadku zaobserwowania niepokojących zmian w stadzie drobiu, zwłaszcza mogących wskazywać na wystąpienie choroby zakaźnej, powinno się brać pod uwagę, w pierwszej kolejności, możliwość pojawienia się wysoce zjadliwej grypy ptaków, a każde podejrzenie wystąpienia tej choroby zgłosić Inspekcji Weterynaryjnej.**
- **Dzikie ptaki wędrowne są potencjalnym źródłem zakażenia.**
- **Celem zabezpieczenia gospodarstw utrzymujących drób, przed grypą ptaków, należy szczególną uwagę poświęcić zasadom bioasekuracji m.in. takim jak :**
  - **skuteczne zabezpieczenie obiektów na fermie przed dostępem dzikiego ptactwa; tak aby nie miało ono kontaktu z utrzymywanym drobiem oraz przetrzymywaną paszą;**
  - **zachowanie wzmożonej czujności na fermach drobiu, w szczególności zlokalizowanych w sąsiedztwie miejsc bytowania dzikich ptaków wędrownych;**
  - **zwrócenie szczególnej uwagi na jakość wykonanych zabiegów dezynfekcji środków transportu dla zwierząt, pasz, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, przed ich wjazdem na teren fermy;**
  - **wyłożenie mat dezynfekcyjnych nasączonych środkiem dezynfekcyjnym.**